

Jobb gyepgazdálkodást!

nyagkeszlet csökkenése járul lényegesen a gyepállomány romlásához. Elmarad a trágyázás, meszezés. A túllegeltetés a szívesen fogyasztott fajok arányát csökkenti, az alullegettetés hatására pedig kiritkul a gyep.

A magról vetett gyepnövények környezeti igénye és a fűkeverékek összeállítás

Nem kétséges, hogy a kiritkult gyepeket sűríteni kell: vagy teljes újravetés-sel, vagy felülvetéssel.

Biztosítani kell a megfelelő magágyat. Biológiaiilag beérett, aprómorzás szerkezetű, megfelelően ülepedett talaj biztosítja a vetőmag esírásását, kihajtását.

Tárcsázás, szántás, mélyítő szántás, hengerezés közül választjuk a legmegfelelőbbet.

Ha a talaj tápanyagokban szegény, műtrágyázásra, ha erősen savanyú, meszezésre van szükség.

Fontos a megfelelő fűfajták megválasztása. A legeltetésre lehetőleg alacsonyabb termetű sűrű állományt fejlesztő fűveket és pillangósokat használjunk. Kaszálásos hasznosításra nagyobb termetű, általában nagyobb termőképességű fűveket és pillangósokat választunk.

A hasznosítási célnál figyelembe kell vennünk a növények izletességét. Legelőre csak szívesen legeltető növényeket válasszunk. Ha szenázs vagy szenaként tartósítjuk a gyep termését, kevésbé izletes, de nagy termőképességűt is választhatunk.

Természetesen a kereskedelemben kapható fűvek kö-

zül tudunk választani. Romániában kevés számú fűmagot termesztenek, a táblázatban azokat sorolom, de a mai összeköttetésekkel nem nehéz általunk ismert, körülményeinknek megfelelő fűfajokat máshol is találni.

Megjegyzés. Keverékben a vetőmagmennyiséget a fűfaj jelenlétének a %-ában használjuk.

Megjegyzések a fűfajok megválasztásánál

Angol perje. Általában az óccáni éghajlaton termeszthető több évig. Már a vetés évében nagy termést ad, és maghozatalra képes. Az alacsony hőmérsékletre és a szárazságra egyaránt érzékeny. Ha történetesen mindkettő éri, már az első év után teljesen kipusztulhat. Az árnyékolást tűri. Legelő létesítésekor a fűmagkeverékben legfeljebb 2-4 kg-ot használunk.

Réti csenkesz. Egyik legértékesebb, magasra nő, lazabokrú szálfü. Jól sarjadzik, a tiprást tűri. legeltetésre és kaszálásra igen alkalmas. A hőmérséklettel szemben igénytelen. Pangó vizet, árasztást hosszabb ideig is elbír. Nagyon sovány, sekély rétegű, nagyon savanyú talajon nem termeszthető. Fehérherével jól társítható.

Csomós ebir. Legértékesebb termesztett évelő pázsitfűvek egyike. Bőtermősége, gyors sarjadzása, kiváló alkalmazkodóképessége közismert. Elsősorban az üde és száraz fekvésű területek növénye, de jó alkalmazkodóképessége miatt a Mezőségtől a fenyőzónáig

mindenütt megterem. A csomós ebir agresszív, más fajokkal vetve azokat pár éven belül kiszorítja.

Réti komócsin. Háromszék és Hargita megye legelterjedtebb termesztett szálfüve. Fagyokkal szemben ellenálló, a talajjal szemben nem igényes. Inkább a kö-

kon ez a faj képes a legnagyobb terméshozatra. Elsősorban kaszálásra alkalmas, de ésszerű legeltetéssel is hasznosítható. Fejlődése gyors, fiatal korban legeltetve is jó takarmányt ad, de idős korban durva fás lesz a szénája.

Táblázat. Leggyakoribb fűfajok és fűmagszükségletek tiszta telepítésnél

magyarul	Név románul	Botanikai csoportosítás	Vetőmag- szükséglet kg ha
Angol perje	<i>Zăzanie</i>	Lazabokrú aljfü	35
Réti cserkesz	<i>Păiuș de livezi</i>	Lazabokrú szálfü	45
Csomós ebir	<i>Golomăt</i>	Lazabokrú szálfü	30
Réti komócsin	<i>Timoftică</i>	Lazabokrú szálfü	36
Vörös csenkesz	<i>Păiuș roșu</i>	Tarackos aljfü	40
Árva rozsnok	<i>Obsiga</i>	Tarackos szálfü	45
Fehérhere	<i>Trifoi alb</i>	Pillangós	10
Szarvaskerep	<i>Ghizdei</i>	Pillangós	16

több talajokat kedveli. Herefűvesek létesítésére főleg vörösherével célszerű telepíteni.

Vörös csenkesz. Tarackos aljfü. A mosoha körülményeket a termesztett fűvek közül legjobban bírja. Elsősorban hegyi legelőink felülvetésére használjuk.

Termesszűnk fűmagot. Kérjük ki a fűmag előállító szakemberek tanácsát, és találjuk meg azt a kereskedelmi céget, aki velünk a termést leszerződi és átveszi. Bármelyik fajt ajánlom, csak az angol perjét nem. Ebből van sok a kereskedelemben, mert nagy terméshoz. A Marosszentgyörgyi Állattenyésztés Kísérleti Állomás a szántóföldi fűmagtermesztéssel nyerte a legnagyobb jövedelmet.



Réti komócsin

1. tő, 2. kalász, 3. kalászcso, 4. fülcso, 5. nyelvecske

Árva rozsnok. Szárazságtűrő, évelő, tarackos szálfü. Erodált, száraz hegyoldala-

Dr. Tamas Lajos